





Zorg rondom PEG-sondes



Fokje Rienstra en Monique de Jager
Endoscopieverpleegkundigen
Verpleegkundig consulenten PEG-zorg
Scholing V&VN 15.02.2022
AmsterdamUMC MDL

Inleiding

- Organisatie PEG-zorg Amsterdam UMC
- Typen sondes en de toegangswegen
- PEG plaatsing
 - indicaties
 - diverse technieken
 - taken verpleegkundigen
 - Nazorg
- Complicaties
- PEG wissels
 - Wanneer, wat, wie
 - Wel of geen Sedatie
 - Materiaal



Organisatie PEG-zorg

PEG-team

- Staf-arts
- Arts-assistent MDL voeding / diëtist
- Consulent MDL
- 2 VPK PEG consulenten locatie VUmc
- 2 KVPK PEG consulenten locatie AMC
- MDL kinderartsen
- Werkgroep voeding

Samenwerking met

- Kindergeneeskunde
- KNO: oncologie / zorgpad
- Neurologie: o.a. ALS, Parkinson / zorgpad
- Chirurgie: MDL problematiek / GIOCA
- Diëtiste
- Transferbureau-polikliniek: nazorg
- Interventieradioloog
- Zorginstellingen
- Facilitair bedrijf
- Huisartsen

Spreekuur

- Dinsdag en vrijdag

Bereikbaarheid

- Via de administratie MDL
- PEG-sein tijdens spreekuurtijden
- peg.info@amsterdamumc.nl



PEG plaatsingen per jaar

Plaatsingen (PULL-PUSH-PEG J)

Gemiddeld 3 per week

150 per jaar

Wissels

Gastrostomie sondes (ballonsonde)

- PEG spreekuur

Gastrosonde interne disk

- Scopie

PEG-J

- Scopie
- Zonder scopie / Over draad




Overzicht Gastro- en Jejunum sondes

Gastrostomiesondes

Op de maag

- Met interne fixatieballon
 - Gatrotube
 - Button
- Met interne fixatieschijf
 - Schijfje
 - Korfje




PEG standaard

PEG J sondes

Via de maag


- 1-delig systeem
 - Ballonsonde
 - PEG J Enkellumen J
 - PEG J Dubbellumen G J
 - Button variant
- 2-delig systeem
 - PEG-sonde met interne fixatieschijf
 - Met extensie naar het jejunum
 - Diverse combinaties CH




PEG jejunum

Direct op het jejunum

- PEJ (niet in het Vumc)
- PRJ
 - 'pigtail' drainkatheter
 - Wissel na 2 wkn naar jejunostomiekatheter 9FR
- Fixatie met pleister




voedingskatheter



jejunostoma

Samenwerking



Pech met de peg

- Aansluitdop kwijt tijdens opname ander ziekenhuis
- Patiënt ingestuurd seh wissel lukt niet in de thuissetting
- Ouder echtpaar komt naar de vu voor een wissel wordt fysiek bijna onmogelijk.
- Ballon in het fistel gevuld patiënt naar de seh
- Patiënt komt op het peg spreekuur voor de eerste controle maar de sonde bungelt los en ook de fixatiedisk staat niet
- Te snel dompelen binnen 7-10 dagen
- Dislocatie maar de insteek afgeplakt en de volgende dag ingestuurd
- Antibiotica kuur voor hypergranulatie
- Verstopte peg
- Niet kunnen dompelen
- Geen materialen op voorraad bij de patiënt
- Balloncontrole lukt niet
- Mediatie/sondevoeding in de ballon

Gezamenlijk bespreken...

- Waar lopen jullie tegen aan?
- Wat mis je aan de overdracht
- Uitvoeringsverzoeken
- Folders..
- Website....
- videobellen
- Wat ontbreekt in de klinische setting
- Scholing
- aandachtsvelders
- Mee met een wissel van een patiënt?

Zijn er nog vragen?

