PEG zorg

MDL centrum LZR



PEG-poli Laurentius Ziekenhuis Roermond

Anneke, Rianne en Maike, MDL- en PEG-verpleegkundige
MDL-arts Dr Bas Verhaegh

PEG= percutane Endoscopische gastrostomie catheter
PRG= percutane Radiologische gastrostomie catheter

PEG-J= PEG met Jejunum catheter (dunne darm)

Wie zien wij?

- Patiënten die niet meer kunnen eten. Die zich snel verslikken of waar de maag-darm funktie van verstoord is. Vaak patiënten met een CVA, ALS, keel- of slokdarmkanker.
- Die krijgen dan sondevoeding via de PEG-sonde, maar ook medicatie kan via de sonde gegeven worden
- Patiënten die Duodopa medicatie voor de ziekte van Parkinson krijgen
- De PEG-sonde MOET 3 maanden blijven zitten, ook al kan patiënt weer zelf eten.

GESPREK VOOR PLAATSING

Eerst spreekt de MDL-arts met de patiënt. Bij akkoord plaatsing:

Poli verpleegkundige: gesprek voor uitleg plaatsing, verzorging.
Liefste met patiënt en zijn/haar familie.
Wij organiseren alle zorg. Van scopie, diëtiste, materialen, controle afspraken.

We vragen bij diëtiste altijd een startpakket aan bij de leverancier van de sondevoeding. Hierin zitten materialen zoals spuiten en gaasjes. De pomp, voeding en startpakket worden paar dagen voor de voeding geleverd bij locatie waar patiënt verblijft.

Wat gaan we doen?

Patient start met een vaste PEG-sonde.
Via scopie wordt deze geplaatst.

Deze blijft tussen de 2-4 jaar zitten.
Niet meer standaard verwisselen.

Dan kan ook gewisseld worden naar een balloncatheter



Na de plaatsing

Antibiotica gaas ipv antibiotica iv.

3 dagen.Daarna nog een keer vervangen door patiënt of verzorger.

Met mesorb verband afplakken.

Makkelijk om patiënten mee te geven of op te sturen.



Eerste week verzorging

Verzorging door patiënt of zorgverlener:

- Niet aankomen, alleen kijken!
- Ontstaat er een ontsteking? Contact opnemen
- 2e of 3e dag Antibioticagaas vervangen.
- Niet douchen of in bad.
- In de avond na plaatsing mag sondevoeding aangesloten worden.
- Sonde altijd doorspoelen met spuit water voor en na voeding of medicatie!
- Fixatieplaatje strak op de huid aansluiten.


- 1 week na plaatsing controle op de PEG poli. Daar verzorgen we de wond.

Tasje van LZR:

- Extra AB-gaasjes
- Absorberend verband
- Folder met alle uitleg per sonde
- Paracetamol zetpillen
- Contactgegevens

Verzorging na de eerste controle


- Mag weer douchen en in bad. Ook zwemmen en sauna mogen na verloop van tijd weer.
- Dagelijks wond/insteek schoonmaken met nat gaasje. Goed droog maken.
- Dompelen 3-4cm van de sonde. Als dit stroef gaat contact opnemen. NIET draaien.
- Geen gaasjes erop zolang de huid droog is.
- Fixatieplaatje aansluiten. Nu op 5mm van de insteek. Wat ruimte ertussen laten. Markeer deze plek met een watervaste stift.



Balloncatheters

- Ballon catheter: gastrotube of button.
- Elke 3-4 maanden ballon catheter gewisseld worden.
- Elke 2 weken controle ballon of deze gevuld is met 5cc water.
- Wanneer patiënten koorts hebben of erg warm weer is, verdampt namelijk ook dit water.

- Gevaar dat sonde kan uitvallen.









Granulaatweefsel behandelen

- Fluticason spray 50 ug/120 dosis
- 2x dgs gedurende 2 weken
- 1x dgs gedurende 2 weken
- Om de dag gedurende 2 weken tot het weg is.
- Op insteek sprayen, maar ook op de splitgaas.

- Met zilvernitraat aanstippen.
- Terracortril druppels of zalf

Huid problemen










- Rode insteek;
- Lekkage van maagsap of voeding
- Infectie

Duodopa = PEG-J sonde

- Duodopa is een vloeibaar middel tegen Parkinson.
- Van parkinson kun je nog niet genezen. Wel zijn er medicijnen die je klachten kunnen verminderen. Zo kan levodopa helpen tegen stijfheid, traagheid en soms ook het trillen.
- Een week opname plannen met de Neuroloog en Duodopa-verpleegkundige
- Controle elke 4-6 maanden in combinatie met een afspraak bij de neuroloog.





Controles PEG sondes

- Een week na plaatsing zien we de patiënten op de poli terug en doen we de eerste verzorging.
- Vanaf dan dagelijks dompelen, niet meer draaien!
- Elke +/- 4 maanden controle poli of telefonisch. (foto per mail)

Bij ballon-catheters zullen we telkens de sonde wisselen.



Vragen?

Stel ze nu of later aan ons team!

Tel: 0475-382768

Mail: peg.poli@lzr.nl